

5.

# DE PARAPHIMOSI

POSITIONES ANATOMICÆ

ET

CHIRURGICÆ

*Quas, DEO JUVANTE, & Præfide M. FRANCISCO  
CHOPART, Artium & Chirurgiæ Magistro, Scholarum  
Professore Regio, & Academiæ Regiæ Chirurgiæ Consiliario,  
tueri conabitur EDMUNDUS-FRANCISCUS SOUPÉ,  
Tornodurensis, liberalium Artium Magister, Theſeos Auſtor.*

*Die Sabbati, 6 Aprilis, anno Salutis 1782, à ſeſqui-ſecundâ  
poſt meridiem ad ſeptimam.*

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS,  
PRO ACTU PUBLICO

ET

MAGISTERII LAUREA:




PARISIIS,

Typis MICHAELIS LAMBERT, Regii Chirurgiæ  
Collégii necnon Academiæ Typographi, viâ Cithareâ.


---

M. DCC. LXXXII.





D. O. M.



POSITIONES ANATOMICÆ

*E T*

CHIRURGICÆ.

DE PARAPHIMOSI.

I.

**P**RÆPUTIUM, balani tegumentum liberum, mobile, laxum, ad dilatationem & corrugationem promptum, vaginam efficit exteriori conflata laminâ, cuti penis continuâ, quæ foraminis modum exhibens quo glandi liberior pateat aditus, in seip-

A 2

sam ita reflectitur, ut interiori, tenuiori, lævique laminâ redeat in valleculam basi seu coronâ glandis hujusce circumscriptam. Quæ quidem ista lamina plures intus obtegit glandulas odoríferas, textumque cellularem, laxiorem quàm in pene, facilè inturgescentem & numquam adipe repletum: eadem profectò cellulosiis vinculis ad involucrum corporum cavernosorum adhæret; dein replicata in ejus posteriori & inferiori parte, inter colliculos balani sese immittens, iisque ferè ad ostium usque urethræ annexa, frænum præbet quo præputium coercetur ne longiùs retrahi queat.

## I I.

Hoc porrò tegumentum in nonnullis apertè desideratur; aut si se prodit, perbreve, & successu temporis, cole sensim excrecente, ita quasi obliteratur ut, in recutitis verbi gratiâ, vix quidquam reperias præputii nomine dignum: in aliis contra, præsertim in pueris, mirum in modum protenditur, adeòque perlongum apparet ut balanus valde in absconso retineatur; in aliis verò breviori aut firmiori fræno adhæret & ægrè retrahitur, aut inter graviores doloris sensus caput penis in erectione distorquens, impotentix causam explicat: denique glandem ita coercitam quandoque involvit ut denudari nequeat; aliquando retrò deducitur, &, ut reducatur, ab amicâ & peritâ manu auxilium efflagitat. De hocce tantùm ultimo præputii vitio, quod *Paraphimosis* nuncupatur, differemus.

## I I I.

PARAPHIMOSIS seu circumligatura ea est præputii retractio ultra balani coronam, tantaque coarctatio ut illud ad anteriora non possit reduci. Multa profectò hujusce ligaturæ repe-



riuntur discrimina : alia recens, alia diutiùs confirmata ; alia acuta, alia chronica & habitualis ; alia verò simplex & sibi commissa, alia, ut sæpiùs accidit, inflammatione, doloribus, febrè, gangrænâ, & interdùm venereâ lue stipata. Mentulati verò, neonupti vel libidinosi, quibus præputium longius angustiusque à naturâ datum est, Paraphimosi frequenter laborant : eodem tentantur vitio verpi & qui curtum nascendo præputium obtinuerunt, si fortè venerea ulcera posteriorem hujusce tegumenti partem obsident, unde magis decurtatum retrò corrugatur, aut cùm tumor præputii tumescentem balanum subsequitur, & impedit quominus jam inflatus magis ullo modo possit obvolvi.

#### I V.

Hujus nimirum morbi natura oculis digitisque facilè dignoscitur. Denudatus balanus à præputio ad glandis radicem retracto atque replicato constringitur : inde circulus sanguinis retardatur aut omnino inhibetur ; oritur inflammatio & invalescit, quâ partes magis ac magis intumescant ; dolores acuti arcessuntur ; urethrâ compressâ, mictio fit difficilis, laboriosa, & quasi ex stillicidio ; accenditur febris ; serum tenue, viscidum, putrescens è balani præputiique superficie exsudat ; in rugis annularibus frænove præputii oriuntur complures vesiculæ cristalloides quæ gangrænâ ingruentem prænunciant ; tandem sphacelus balanum corripit. At verò Paraphimosis nec periculum nec gravem molestiam importat, dùmmodo minori coarctatione partes afficiantur ; tum lamina præputii interior frænumve impactâ lymphâ turgent ; tumor vel mollis & quasi adematodes, vel durus & skirrodes producitur, qui mitioribus comitatur symptomatibus & generationis operi tantùm nocet.

## V.

PRO mali naturâ variisque hujus effectibus varia instituitur prognosis. Quò magis recens est & benignum, eò facilius profligatur; quò diutius inhæret inflammatione comitatum, eò certius periculum imminet ingruentis gangrænæ; ideòque vividiori conatu ablegandum: si malignum, seu venereis symptomatibus fœtum exsurgit, tum gravius est & curatu perdifficilius.

## V I.

PARAPHIMOSEOS curatio sic absolvitur: præputium retractum & glandem strangulans laxetur & reducatur. Quod quidem facile obtineri potest in recenti circumligaturâ, si colis in aquam frigidam demissus, inter utriusque manûs indicem & medium digitos subitò comprehendatur; & si balani latera per admotos pollices comprimantur & intus repellantur, dùm præputium aliis digitis gnaviter antrorsum adducitur, donec balanus longior inde factus, & exilior omninò contactus remaneat. Ea verò reductio difficilis evadit, cùm glans jam tumens inflammatione tenetur; imò etiam eadem sæpè alio non potest modo fieri, quin prius emollientes adhibeantur foci, balnea lactis oleive tepidi & quandoque venarum sectiones celebrentur; quæ dum peragitur, gravioribus & eheu! ineluctabilibus ægri sæpissimè cruciantur doloribus: longè igitur satius esset, reductione semel infelicitè tentatâ, partem præputii nimis adstrictam scalpello discindere; quo nova Paraphimosis aliundè averteretur. Hujusce autem operationis urgentem indicat neessitatem gravis inflammatio penis in gangrænâ mox abitura, & hic est modus operandi; plicæ corrugati præputii hinc & inde imprimis ad utrumque fræni latus & juxta balani coronam ubi fortiores insident, quàm celerrimè incidantur perpendiculari & satis altâ

plagâ ut tegumentum illud solutum liberè ad extremam glandis ad-  
ducatur: cavendum tamen est ne eâ sectione corporum cavernoso-  
rum involucrum vel urethra lædantur. Quo factò , ritè fovean-  
tur incisiones , eluantur atque detergantur injectionibus decocti  
hordei cum melle rosaceo , donec ad exoptatam cicatricem  
deveniant : expedit etiam , ut æger præputium circa glandem  
extremam comprehensum urinâ irriget , illudque summâ curâ  
ad balanum trahat , eòque retrahat , ne fortè partes sibi invi-  
cem agglutinentur : id quoque non minoris momenti est , ut  
penis semper sursùm & ad ventrem supinus leniter alligetur.  
Si tandem quid sphacelo correptum reperiatur , cautâ manu  
etiam scarificandum , tùm ut ruga , si quæ est , abditè coarctans  
laxetur , tùm ut sanguis putridus effluat , & topica ad putre-  
dinem coercendam opportunitiora altiùs faciliùsque penetrare  
queant. Deinde partis mortuæ secessio solis est naturæ viribus  
committenda.



